


### Ⅲ. 2015年集計＜部位別＞

#### 4. 乳房




件数は14年と比較して差異がほぼ見られない。年齢層は40歳代から増加傾向にある。

#### 主な紹介元


| 施設名          | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 計   |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 札幌ことに乳腺クリニック | 24  | 30  | 42  | 57  | 37  | 190 |
| 札幌乳腺外科クリニック  | 1   | 7   | 3   | 9   | 7   | 27  |
| 手稲溪仁会病院      | 3   | 3   | 6   | 3   | 4   | 19  |
| わだ内科外科クリニック  |     | 2   | 3   | 2   | 4   | 11  |
| 麻生乳腺甲状腺クリニック |     | 3   | 1   | 1   | 3   | 8   |

#### 主な紹介先


| 施設名               | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 計 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 札幌乳腺外科クリニック       |     |     | 1   |     | 2   | 3 |
| 札幌ことに乳腺クリニック      | 3   |     | 1   | 1   | 1   | 6 |
| 札幌駅前しきしま乳腺外科クリニック |     |     | 1   |     | 1   | 2 |
| 愛育病院              |     |     |     |     | 1   | 1 |
| 北海道大学病院           |     |     |     |     | 1   | 1 |
| 札幌西円山病院           |     |     |     |     | 1   | 1 |




「他院より紹介」の割合が高い。




「自主・不明」の割合が高い。




「自院診断・自院治療」と「他院治療後」の割合が高い。



詳細部位は「乳房上外側4分の1(C)」が多い。  
組織型は「浸潤性導管癌」が大半を占めている。



治療前ステージは「I期」と「II期」の割合が14年に一時減少していたが、15年には増加している。  
術後ステージは「術前治療後※」が増加している。  
※他院治療開始後に放射線療法目的にて当院に来院する症例が含まれる。



0期は「手術のみ」が約7割を占めている。I期・II期は「手術/内視鏡+薬物」、III期は「手術/内視鏡+放射線+薬物」、IV期は「薬物療法のみ」の治療の割合が高い。